

令和3年度 市単独補助事業

サツマイモ基腐病防除緊急対策事業のご案内

アミスター20フロアブルの購入経費の一部を助成します

令和3年産のサツマイモ栽培において、サツマイモ基腐病に対して予防・治療効果が高い薬剤を活用した防除対策を徹底し、被害の拡大を阻止する目的として実施するものです。

1. 対象者

令和3年産においてサツマイモを生産している農家
(青果用、澱粉用、焼酎用、加工用の全てが対象です)

2. 事業内容

- (1) サツマイモ基腐病の殺菌剤(治療薬)「アミスター20 フロアブル」の購入代金の1/3を助成
- (2) 上限本数 20a あたり 250ml(1本)
- (3) 補助対象面積の上限は、作付面積とし、協議会の現地確認調査(6月予定)により決定します。

3. 申請に必要な書類 ※申請期間は、補助対象面積決定通知時にお知らせいたします。

- (1) 補助金申請書等
- (2) 購入した「アミスター20 フロアブル」の領収書又は納品書等
※領収書又は納品書は、保管をお願いいたします。

4. 補助対象期間

令和3年4月1日(木)～令和3年7月31日(土)に購入したものを。

5. 購入販売店

・JA 種子屋久物流センター ・(有)川崎肥料店



【問合せ先】

西之表市さつまいも重要病害虫対策協議会

市役所農林水産課営農振興係内Tel22-1111(内線 265・248)





薬剤散布による防除(体系防除の暫定版)

ここがポイント!

- この薬剤散布体系は、適正な苗消毒と本圃の排水対策を実施していることが前提。
- 前作に基腐病が発生した圃場では、生育初期から発病株が次々と現れてくるため、活着後は、異常株の除去と銅剤散布を行う。
- 異常株除去後の補植は、再発病する可能性が高いため、実施しない。
- 苗消毒による感染防止効果が低下する定植5週目頃に、予防・殺菌効果のある剤を散布する。
- 茎葉の生育が旺盛になり畝間を覆い始める時期以降は、畝間に停滞水が生じるような豪雨や雨を伴う台風の後、速やかに予防・殺菌効果のある剤を散布して、二次伝染による基腐病の圃場全体へのまん延を防止する。

<体系防除の前提条件>

適正な苗消毒および本圃の排水対策を実施していること

生育ステージ	 定植2週目~	 定植5週目頃	 定植6週~(茎葉が畝間を覆う) 梅雨時期の豪雨等	 台風
発病状況	発病株散見 苗消毒で取りこぼした株の発病	発病株の増加 前作の土壌残渣由来の発病も始まる	二次伝染による 病気の拡大 病原菌の拡散	病勢進展 地上部の一部が枯死
防除方法・薬剤	苗消毒効果 (定植5~6週目まで)	<ul style="list-style-type: none"> ・アミスター20フロアブルの使用回数は3回以内です。 ・耐性菌管理の観点からも銅剤と交互に使用しましょう。 ・アミスター20フロアブルのみでの防除はさけましょう。 		
銅剤	異常株の除去とその周辺株への銅剤散布		銅剤散布	アミスターの運用をさけるため交互に散布
アミスター20フロアブル	異常株除去と散布	畝間に水が溜まるような降雨後や風雨を伴う台風通過直後に散布		

散布剤の種類・名称及び使用方法

銅剤	ジーファイン水和剤 1000倍	散布回数制限なし	収穫前日まで
	Zボルドー水和剤 500倍	散布回数制限なし	収穫前日まで

※ 殺菌剤 **新規登録** アミスター20フロアブル 2000倍 使用回数3回以内 収穫14日前まで

農薬の使用にあたっては、使用基準を順守して下さい!

【お問い合わせ先】 市役所農林水産課営農振興係 電話：22-1111 (内線 248・265)